Oft sind Muttermale nicht nur ästhetisch störend, sondern irritieren durch Reibung an Kleidung. Zeigt sich eine Veränderung an Größe, Form und/oder Farbe sollten sie in jedem Fall entfernt und zur feingeweblichen Aufarbeitung geschickt werden.

## Fachärztin für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie Herrenstraße 54 . 4020 Linz E office@dr-ossberger.at T +43 / (0)650 / 66 11 448

## Vor dem Eingriff:

Absetzen von gerinnungshemmenden Medikamenten (Marcoumar, Thrombo ASS,...) eine Woche vor dem geplanten Eingriff, sowie eine Woche danach.

Beschränken Sie oder noch besser stoppen Sie den Nikotinkonsum mindestens für 2 Wochen vor dem Eingriff bzw. 4 Wochen danach.

## Während des Eingriffs:

Der Eingriff wird in Lokalanästhesie durchgeführt. Die Schnittführung orientiert sich an den natürlichen Hautlinien, sodass die Narbe nach dem abblassen kaum ersichtlich ist.

## Nach dem Eingriff:

Die Nähte werden je nach Region nach 7-14 Tagen entfernt. Bis dahin kann ein Schutzverband angebracht werden und sie sollten vor Nässe und Sonne geschützt werden.

Die Kosten sind abhängig vom erforderlichen Umfang des Eingriffes und eventuellen zusätzlichen Leistungen (z.B.: Wirkstoffkombinationen oder Kombinationseingriffe). Im Komplettpreis sind die Vor- und Nachbehandlung inkludiert.